

DECOUVREZ L'EFFET

OXY

Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S

Détergents et désinfectants sporicides¹
prêts à l'emploi avec le Hi-speed H₂O₂™


**SPORICIDE¹ SELON
EN 17126 ET
MÉTHODE VAH 19²**

Les produits innovants Incidin™ OxyFoam S & Incidin™ OxyWipe S offrent l'avantage exceptionnel d'une formulation de peroxyde d'hydrogène brevetée ayant un large spectre d'action.

Ils agissent contre un large spectre de bactéries et de virus; du fait de leur taux rapide d'évaporation, ils ne laissent pas de résidus actifs. L'efficacité d'OxyWipe S a été testée sur la base de la solution d'imprégnation formée sur la lingette.

Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S offrent :

- ▲ Des produits finis sporicides¹, C. diff. selon EN1726 et virucides
- ▲ Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Grande facilité d'utilisation
- ▲ Excellente compatibilité



Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S

Détergents et désinfectants sporicides¹
prêts à l'emploi avec le Hi-speed H₂O₂TM

Notre prestation	Votre avantage
EFFICACE	Large spectre et bref temps d'action
SUR	Excellente compatibilité des matériaux - pas de résidus actifs - le principe actif se décompose en eau et en oxygène.
FACILE À UTILISER	Détergents et désinfectants prêts à l'emploi - Nettoyage et désinfection en un clin d'œil

EFFICACITÉ	Temps d'action OXYFOAM S	Temps d'action OXYWIPE S
Désinfection des surfaces selon la méthode VAH 2015, charge élevée		
Bactéricide, levuricide	5 min.	15 min.
Fongicide	5 min.	30 min.
Tuberculocide, mycobactéricide	15 min.	30 min.
Contrôle selon la directive DVV/RKI		
Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC) selon les recommandations RKI 1/2004*	15 sec.	30 sec.
Norovirus (MNV)*	30 min.	60 min.
Adénovirus*	30 sec.	1 min.
Papovavirus / polyomavirus / SV40*	30 sec.	30 sec.
Rotavirus*	15 sec.	15 sec.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bactéricide)	1 min.	2 min.
EN 13624 (levuricide)	1 min.	15 min.
EN 13624 (fongicide)	5 min.	30 min.
EN 14348 (tuberculocide, mycobactéricide)	5 min.	30 min.
EN 14476 (virucide)	2 Min.**/30 min.	30 min.**
EN 14476 (Action virucide limitée PLUS)	1 Min.**/15 min.	15 min.
EN 14476 (adénovirus)	30 sec.	30 sec.
EN 14476 (norovirus)	1 Min.**/15 min.	15 min.
EN 17126 (sporicide)	60 min.**	-
EN 17126 (C. difficile)	30 min.**/60 min.	60 min.
Normes EURO test à 4 domaines (charge élevée)		
EN 16615 (bactéricide)	1 min.	2 min.
EN 16615 (levuricide)	1 min.	1 min.
EN 16615 (fongicide)	5 min.	5 min.
EN 16615 (tuberculocide, mycobactéricide)	5 min.	5 min.
Sporicide contre C. diff selon la méthode VAH 19 / CEN TC 216 WG1 prWI Oct 2020 (méthodologie EN 16615)	15 min.**	15 min.**

* DVV 2015 (Test de susp.) ** charge faible

INSTRUCTIONS D'EMPLOI POUR INCIDIN™ OXYFOAM S



- 1 Vaporiser sur la surface à une distance d'env. 30 cm
- 2 Nettoyez la surface à l'aide d'une lingette. Veuillez à mouiller correctement
- 3 Laisser sécher



- 1 Pulvériser le produit sur une lingette propre
- 2 Nettoyez la surface. Veuillez à mouiller correctement
- 3 Laisser sécher

Distribué par :

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

CE 0297



CHAMP D'APPLICATION

Incidin™ OxyFoam S:
Spray moussant destiné au nettoyage et à la désinfection de surfaces médicales (y compris p. ex. les sondes) et de l'équipement médical.



Incidin™ OxyWipe S:
Lingettes de nettoyage et de désinfection pour surfaces médicales (y compris p. ex. les sondes) et l'équipement médical.

CHZN 4102
CHZN 4100

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Incidin™ OxyFoam S: Solution prête à l'emploi. Vaporiser non dilué sur des surfaces et objets à une distance d'env. 30 cm et veiller à une humectation suffisante. Puis essuyer à l'aide d'un chiffon propre ou alors appliquer le produit non dilué sur du chiffon à usage unique pour essuyer et laisser sécher les surfaces.

Incidin™ OxyWipe S: Retirer les lingettes une à une, puis humecter complètement les surfaces à nettoyer et laisser sécher. Refermer le flow pack.

Ne pas employer sur des surfaces sensibles à l'oxydation comme celles faites de marbre, de cuivre et de laiton.

PRINCIPE ACTIF

100 g contiennent :

Incidin™ OxyFoam S :
1,5 g de peroxyde d'hydrogène

Incidin™ OxyWipe S :
1,5 g de peroxyde d'hydrogène

EXPERTISES

Largelement testé au niveau microbiologique, virologique, toxicologique et écologique. Sur demande nous vous mettons notre dossier d'expertises à disposition.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET DE COMMANDE

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750 ml	30 820 60
Incidin™ OxyFoam S	2 x 5 L	30 874 50
Robinet de vidange pour solutions prêtes (DIN 51)	1 pièce	100 338 73
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 lingettes Taille de lingette : 20 x 20 cm	30 822 40
Incidin™ OxyWipe S XL	6 x 50 lingettes Taille de lingette : 25 x 37 cm	30 920 40
Support mural pour Incidin™ OxyWipe S	1 x 6 pièces	100 338 77

STOCKAGE

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, dans son emballage d'origine. À stocker en milieu frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil. Conservation après ouverture : **Incidin™ OxyFoam S :** Jusqu'à la date de péremption imprimée **Incidin™ OxyWipe S :** 3 mois

Références

1. Incidin™ OxyWipe S est sporicide contre les spores de C. difficile.
2. Sporicide contre les spores de C. difficile.

VEILLEZ A LA PRUDENCE AVEC LES PRODUITS BIOCIDES ET MEDICAUX L'ETUDE DE L'ETIQUETTE ET DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE UTILISATION. RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL.